

ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2563

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา

ด้วงงวงจี้ว และด้วงเจาะผลสละ

เกษตรกรผู้ปลูกสละให้ระวังการเข้าทำลายของด้วงงวงจี้ว และด้วงเจาะผลสละ ซึ่งมักพบในระยะออกดอกและติดผล ทำให้ไม่ติดดอก หรือติดดอกน้อยลง ส่งผลให้มีผลผลิตลดลง ซึ่งเกษตรกรจะไม่สามารถสังเกตการเข้าทำลายของด้วงเจาะผลสละ จากภายนอกได้

การทำลาย



ด้วงงวงจี้ว

ตัวเต็มวัยจะวางไข่บนช่อดอกของสละทั้งดอกตัวผู้และตัวเมีย เมื่อหนอนฟักออกจากไข่ จะเจาะซอนเข้าไปที่แกนของช่อดอกทำให้ช่อดอกเกิดแผลเน่า และแห้ง โดยเฉพาะช่อดอกตัวเมีย ผลอ่อนจะหลุดออกมาทำให้ไม่ติดผล เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

ระยะหนอนมีสีขาวขุ่น กัดกินอยู่ที่บริเวณเนื้อของผลสละ หนอนระยะสุดท้ายเจาะเข้าไปในเมล็ดเพื่อเข้าดักแด้ ตัวเต็มวัยเป็นด้วงขนาดเล็ก เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว ลำตัวรี มีลำตัวยาวประมาณ 5-9 มิลลิเมตร ปีกแข็งสีน้ำตาล มีจุดสีดำกระจายทั้งปีก ปากเป็นแบบกัดกิน รูปร่างแบน ยาวคล้ายจอบยื่น ผสมพันธุ์ในตอนเช้าในช่วงเวลา 7.30-8.30 น. และสามารถผสมพันธุ์ได้หลายครั้ง



ด้วงเจาะผลสละ

การจัดการ

✱ หมั่นสำรวจแปลง และนำส่วนที่ได้รับความเสียหายไปทำลาย

✱ ห่อผลสละด้วยถุงผ้าตาข่าย ตั้งแต่ผลสละอายุ 6 เดือน

✱ พ่นด้วยสารพิริมีฟอส-เมทิล 50% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นตั้งแต่ผลสละอายุ 6 เดือน จนกระทั่งก่อนเก็บเกี่ยว ทุก 15 วัน

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา โทร. 074-557940

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โทร. 074- 330260