

ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เตือนเกษตรกรระวังโรคไวรัสใบหงิกเหลืองพริก



ระยะนี้บางพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงหวี่ขาว ให้ระวังการระบาดของโรคไวรัสใบหงิกเหลืองพริก เพราะทำให้เกิดการระบาดของโรคไวรัสใบหงิกเหลืองพริกได้



สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัส Pepper yellow leaf curl virus

อาการ



ใบต่างเหลืองซีด หรือโปร่งแสงเป็นหย่อมๆ เส้นใบย่นยมีสีเหลืองและ
สานกันเป็นร่างแห ใบโค้งงอ หงิกย่น บิดเบี้ยว ยอดเป็นกระจุก
ต้นแคระแกร็น ดอกร่วง ผลมีสีซีด ขนาดเล็กและหงิกงอ

การแพร่ระบาด

ติดจากเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ที่เป็นโรค แมลงหวี่ขาว และอุปกรณ์ตัดแต่ง

การจัดการ

*** ใช้เมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์จากแหล่งปลอดโรคและเชื้อถือได้**

*** ถอนต้นเป็นโรคไปทำลาย** *** ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ตัดแต่ง ผึ่งแดด**

*** กำจัดวัชพืชในแปลงและบริเวณใกล้เคียงเพื่อลดการสะสมของโรคและแมลง**

*** กำจัดแมลงหวี่ขาวด้วยเชื้อราบิวเวอเรีย หรือปิโตรเลียมออยล์ โดยฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอ หากระบาดมากให้ใช้สารเคมีฉีดพ่น แต่ไม่ควรฉีดสารเคมีกำจัดแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง**

*** ไม่ปลูกพืชหมุนเวียนที่เป็นพืชอาศัย เช่น มะเขือเทศ**

