




ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑



เดือนขาวนาระวังโรคขอบใบแห้ง และโรคใบขีดสีน้ำตาล

หนู – เกษตรกรในจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ตรัง ยะลา และปัตตานี ให้ระวังการระบาดของหนู เพราะอาจมีหนูเข้าทำลายต้นข้าวและผลผลิต

โรคใบขีดสีน้ำตาล – อาจเกิดการระบาดได้โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง เช่น ข้าวเลียง เล็บนก และอัลฮัม เป็นต้น ซึ่งพบว่ามีเกิดการเกิดโรคใบขีดสีน้ำตาลอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะเขตที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เดือนขาวนาอาจต้องมีการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาในแปลงนาเพื่อเป็นการป้องกันการระบาด

โรคขอบใบแห้ง – ระยนี้ยังคงมีฝนตกชุกติดต่อโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง ชาวนาควรหมั่นสำรวจแปลงนา ระวังโรคขอบใบแห้งข้าวระบาด เดือนขาวนาระวังการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูงหรือพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของโรคขอบใบแห้งมาก่อน เมื่อเกิดการระบาดไม่ควรระบายน้ำจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่นใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น ไอโซโพรไทโอเลน คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ สเตร์พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์ ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต

โรคใบแห้ง – ะยะนี้มีฝนตกชุกเกษตรกรต้องหมั่นตรวจดูระดับน้ำในนา อย่าให้ท่วมต้นข้าวนานเกินไป และถ้าเกิดการระบาดให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์

หนอนห่อใบข้าว – เกษตรกรในจังหวัดสตูล ตรัง พัทลุง และสงขลา ต้องหมั่นตรวจดูแปลงข้าวในระยะนี้ เพราะอาจมีการระบาดของหนอนห่อใบข้าว หากพบการระบาด

หนอนกอข้าว – เกษตรกรในบางพื้นที่ของตรัง พัทลุง และสตูล อาจพบการเข้าทำลายของหนอนกอข้าว

หอยเชอรี่ – ในเขตจังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา โดยเฉพาะเขตอำเภอสทิงพระ อาจเกิดการระบาดของหอยเชอรี่ในระยะนี้ เพราะบางพื้นที่อาจมี ศัตรูธรรมชาติของหอยเชอรี่น้อย (เช่น นกปากห่าง)



สวนผลไม้หรือไม้ยืนต้นบางพื้นที่อาจประสบอุทกภัย หรือมีฝนตกหนักจนดินอมน้ำ พืชมักแสดงอาการอาการใบเหลือง หรือร่วงหล่น ซึ่งในวันแรกจะแสดงอาการไม่ชัดเจน ต่อมาจะพบชัดเจนมากขึ้น และมักจะพบอาการดังกล่าวเกิดขึ้นที่ใบมีอายุแก่หรือใบที่อยู่ทางส่วนโคนของกิ่ง ดอกและผลผลิตร่วง การดูแลสวนไม้ผลให้กลับสู่สภาวะปกติ จึงมีหลักการ ดังนี้

๑. ห้ามเข้าไปในสวนในขณะที่ดินยังนุ่มอยู่ เพราะจะทำให้ระบบรากเสียหายมากกว่าเดิม

๒. หลังน้ำลดสัก ๑-๒ สัปดาห์ ให้ใช้ปูนขาว หรือโดโลไมต์ หว่านบางๆ ใต้ทรงพุ่ม

๓. เมื่อดินแห้งแล้วให้เร่งทำการฟื้นฟูระบบรากกลับมาให้เร็วที่สุด โดยใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาหว่านใต้ทรงพุ่ม รดน้ำเล็กน้อย และควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช รากพืชจะแตกใหม่ได้ดีขึ้น

๔. ลดปริมาณการคายน้ำ และการใช้สารอาหารของพืช โดยการตัดแต่งกิ่ง และผล

๕. ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในระหว่างที่ระบบรากยังไม่สามารถดูดธาตุอาหารจากดินได้ตามปกติ เพื่อป้องกันการทรุดโทรมของลำต้น และใบ

สำหรับไม้ผลหรือไม้ยืนต้นที่ไม่ได้ประสบสภาวะน้ำท่วม

ทุเรียน – ในระยะนี้มีฝนตกค่อนข้างชุกส่งผลให้ความชื้นในอากาศยังสูง ดินอึมน้ำ ให้ระวังโรครากเน่าโคนเน่า และโรคราใบติด ซึ่งอาจพบการระบาดในหลาย ๆ พื้นที่ แนะนำเกษตรกรจัดทำร่องระบายน้ำออกจากบริเวณเขตราก ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคดังกล่าว

ส้มเขียวหวาน และส้มโชกุน – ระยะนี้เกษตรกรควรระวังการเข้าทำลายของหนอนซอนใบ และโรครากเน่าโคนเน่า

ส้มโอ – ระวังหนอนเจาะผล หนอนซอนใบ เกษตรกรควรห่อผลป้องกันการทำลายของหนอนเจาะผล สำหรับหนอนซอนใบให้ใช้ปิโตเลียมออยชนิดพ่นป้องกันกำจัด

มะละกอ – ระยะนี้มีปริมาณฝนตกมากขึ้นเกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคแอนแทรคโนส แนะนำเกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ในการป้องกันกำจัด นอกจากนี้ยังมีโรคใบจุดสีน้ำตาลที่จะระบาดในระยะนี้ แนะนำเกษตรกรฉีดแคลเซียม-โบรอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงต้านทานโรคให้กับมะละกอ บางพื้นที่อาจต้องใช้พลาสติกคลุมโคนต้นเพื่อไม่ให้มะละกอได้รับน้ำมากเกินไป

ฝรั่ง – ระวังการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคสแคป และโรคแอนแทรคโนส แนะนำเกษตรกรฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นประจำทั่วทรงพุ่มและผล จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงห่อเพื่อป้องกันโรคแอนแทรคโนส ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกัน หรือมีความชื้นในแปลงปลูกมาก ให้เกษตรกรฉีดพ่นธาตุแคลเซียมโบรอนทุก ๗ วัน ในระยะติดผลอ่อน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงต้านทานโรคให้แก่ฝรั่งด้วย

หนอนหัวด้ามะพร้าว ศัตรูมะพร้าวที่ต้องร่วมใจกำจัด

หนอนหัวด้ามะพร้าว เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งที่กำลังระบาดทำความเสียหายให้กับสวนมะพร้าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งพบการทำลายในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สตูล และสงขลา ในบางพื้นที่อาจพบหนอนหัวด้ามะพร้าวทำลายใบปาล์มน้ำมัน หรือต้นตาลโตนดด้วย โดยหนอนหัวด้ามะพร้าวจะทำลายทางใบล่าง เกษตรกรสามารถสังเกตเห็นอุโมงค์อยู่ใต้ใบ ซึ่งสร้างจากขี้หนอน เมื่อเอามือเขี่ยอุโมงค์ พบหนอนสีเขียว หัวสีดำ หรือดักแด้ผีเสื้ออยู่ภายใน หากพบเกษตรกรสามารถตัดทางใบที่มีหนอนหัวด้ามะพร้าวอาศัยอยู่ ลงมาเผาทำลาย พร้อมทั้งขอสนับสนุนแตนเบียนหนอนหัวด้ามะพร้าวจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เพื่อปล่อยในสวนมะพร้าว สำหรับเกษตรกรที่ต้องการแตนเบียนหนอนหัวด้ามะพร้าวจะต้องแจ้งให้ **เกษตรตำบลทวน** เพื่อดำเนินการต่อไป



เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซียมมิตรของเกษตรกร ช่วยควบคุมศัตรูพืชปลอดภัยต่อสุขภาพ

พืชตระกูลกะหล่ำ – ระยะนี้ภาคใต้ตอนล่างไม่เหมาะแก่การปลูกผักตระกูลกะหล่ำ เนื่องจากฝนตกชุก เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำในระยะนี้ ควรมีโรงเรือนป้องกันฝน เพื่อไม่ให้กล้าผักเสียหาย สำหรับผักที่โตแล้วต้องระวังการระบาดของ **โรคน้ำค้าง** ซึ่งมีสาเหตุมาจากผักที่ปลูกได้รับความกระทบกระเทือนจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ทำให้ใบผักชำเชื้อราสามารถเข้าทำลายได้ง่าย ประกอบกับมีความชื้นสะสมอยู่ในแปลงมาก แนะนำเกษตรกรหลีกเลี่ยงการปลูกผักในระยะนี้

ถั่วฝักยาว – ระยะนี้ให้ระวัง **ไวรัส** ซึ่งระบาดหนักอยู่ในแหล่งปลูกผักของภาคใต้ สาเหตุหลัก มีสองประการด้วยกัน คือ แมลงพาหะโดยเฉพาะเพลี้ยไฟ หรือไวรัสอาจติดมากับเมล็ดพันธุ์ แนะนำให้เกษตรกรใช้สารสกัดสะเดา เชื้อบีที หรือเชื้อราบิวเวอเรีย ร่วมกันเพื่อควบคุมแมลงในแปลงถั่ว เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากเชื้อไวรัส นอกจากนี้เกษตรกรควรเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นถั่วฝักยาว โดยการฉีดพ่นธาตุ แคลเซียม-โบรอน เป็นประจำทุก ๗ วัน และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ำแล้วฉีดพ่น เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราให้ทั่วทรงพุ่ม

พืชตระกูลแตง – ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของโรคโคนเน่าตายโหง โรคแอนแทรคโนส และโรครากเน่าโคนเน่า เพราะมีความชื้นค่อนข้างมาก ประกอบกับมีฝนตกในระยะนี้ แนะนำเกษตรกรหมั่นทำความสะอาดแปลงปลูก และผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณทรงพุ่ม พร้อมทั้งฉีด **แคลเซียม-โบรอน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและต้านทานโรคบริเวณทรงพุ่ม (ส่วนเหนือดิน)** นอกจากนี้ยังต้องหมั่นสำรวจการระบาดของเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ **ด้วงเต่าแตง แมลงวันแตง หนอนผีเสื้อศัตรูแตงชนิดต่างๆ เช่น หนอนคืบ และหนอนกินผิวเปลือกแตงโม** แนะนำเกษตรกรควรควบคุมหนอนผีเสื้อ โดยใช้สารสกัดสะเดาสลับกับเชื้อบีที หรือร่วมกับการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย นอกจากนี้ให้ระวังการเข้าทำลายของแมลงวันแตงโดยใช้ผลิตภัณฑ์บีโตเลียมออยล์ อัตรา ๑/๔ ของคำแนะนำในฉลาก

พริก – ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหมั่นสำรวจการระบาดของโรคแอนแทรคโนส (โรคกุ้งแห้ง) โรคเหี่ยวเหสีอง และโรครากเน่าโคนเน่า เกษตรกรควรฉีดแคลเซียม-โบรอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงต้านทานต่อโรคให้แก่พริก และฉีดพ่นธาตุสังกะสี เพื่อให้พริกสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น หมั่นรักษาความสะอาดในแปลงพริก ถ้าหากสำรวจพบการระบาดของโรคแอนแทรคโนส โรคเหี่ยว และโรครากเน่าโคนเน่าในแปลงพริกให้ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วทรงพุ่ม พร้อมทั้งใช้เชื้อรา ไตรโคเดอร์มาผสมรำละเอียด และปุ๋ยหมัก อัตราส่วน ๑:๔:๑๐๐ หว่านรอบทรงพุ่ม เก็บผล และต้นที่เป็นโรคออกเผาทำลายนอกแปลงปลูก



.....