

ข่าวเดือนการระบาดศัตรูพืช



ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา

ฉบับที่ ๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ระวัง !!! ผีเสื้อมวนหวานทำลายผลผลิต

เดือนเกษตรกรเฝ้าระวังผีเสื้อมวนหวานทำลายผลผลิต เพราะระยะนี้ผลไม้ชนิดต่าง ๆ ททยออกผลผลิตมากขึ้น เช่น มังคุด ลองกอง ลางสาด ฝรั่ง กระท้อน ส้มแขก และ ส้มโชกุน เป็นต้น อาจสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ได้



ลักษณะและวงจรชีวิต ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญ่ ปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลปนเทา ปีกคู่หลังมีสีเหลืองส้ม ขอบปีกด้านบนสีดำและกลางปีกมีแถบสีดำคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างละ ๑ อัน อายุ ๓๐ -๓๓ วัน วางไข่ฟองเดี่ยว ลักษณะกลมมีสีเหลืองเขียว ระยะไข่ ๓ -๔ วัน ระยะหนอน ๑๒ -๒๑ วัน และระยะดักแด้ ๑๐ -๑๒ วัน



การทำลาย ทำลายผลไม้โดยใช้วงปากที่แข็งแรงประมาณ ๒.๕ ซม. แทงเจาะทะลุผิวเปลือก และดูดกินน้ำหวานในผลไม้สุกเป็นอาหาร ผลที่ถูกผีเสื้อเจาะทำลายมักมีรอย เช่น ผลลองกอง เป็นวงสีน้ำตาล มีน้ำเยิ้มออกมาจากรอยเจาะ ต่อมาผลเน่าและร่วงลงดิน

การจัดการ

๑. ห่อผลด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์โดยการห่อเป็นรูปกรวยสามเหลี่ยม และเปิดที่ปลายโคนเพื่อเป็นช่องให้อากาศผ่านกันการเกิดผลเน่าหรือห่อด้วยถุงห่อผลไม้ และหมั่นกำจัดวัชพืชในสวน
๒. ใช้กับดักแสงไฟจากหลอดแบล็คไลท์ โดยนำภาดที่ผสมน้ำกับผงซักฟอกมาวางไว้ใต้หลอดไฟ และใช้สวิงจับตัวเต็มวัยในเวลาากลางคืน โดยใช้ไฟฉายส่องตามผล ข่อผล เริ่มในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. แล้วนำไปทำลาย และสูมควันไฟช่วงพลบค่ำ
๓. ใช้กรงกับดักมุ้งตาข่ายดักจับตัวเต็มวัย โดยวางสัปดาห์ละครั้ง หรือกล้วยน้ำว้าสุกไว้ข้างใน
๔. การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา มวนพิฆาต หรือมวนเพชฌฆาต



ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-557940 e-mail : pmc06@doae.go.th