



ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ทำ

เตือนชาวนาระวังหนอนห่อใบข้าว โรคไหม้ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด

หนู - เกษตรกรในจังหวัดสตูลให้ระวังการระบาดของหนู เพราะอาจมีหนูเข้าทำลายต้นข้าวและผลผลิต

โรคไหม้คอรวง - เกษตรกรในเขตพื้นที่ที่มีฝนตก โดยเฉพาะในแปลงที่หว่านข้าวในอัตราหนาแน่นสูง ไม่ได้ทำการคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก หรือพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของโรคไหม้ข้าว เช่น อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา ให้ระวังการระบาดของโรคไหม้คอรวง

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล - เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา ให้ระวังการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพราะเป็นพื้นที่ที่เคยพบการทำลาย

หนอนห่อใบข้าว - เกษตรกรในจังหวัดปัตตานี และสตูลต้องหมั่นตรวจดูแปลงข้าวในระยะกล้าในระยะนี้ อาจมีการระบาดของหนอนม้วนใบข้าว

หอยเชอรี่ - ในพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมือง จังหวัดสตูล และอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ให้ระวังการระบาดของหอยเชอรี่ในระยะนี้

แมลงสี - ในบางพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงให้อาจพบการระบาดของแมลงสี แนะนำเกษตรกรให้ใช้เชื้อราบีวเวอเรียในการป้องกันกำจัด อัตราส่วน ๒๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

กลุ่มไม้ผล

เงาะ - ระยะนี้มักพบเห็นการระบาดของเพลี้ยแป้ง ในเขตอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล หากพบการระบาดให้ทำการกำจัดด้วยเชื้อราบีวเวอเรีย

ทุเรียน - ระยะนี้สวนทุเรียนบางแห่งอาจจะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ทุเรียนก็จะเข้าสู่ช่วงแตกใบอ่อนให้ระวังการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ เกษตรกรควรหมั่นสำรวจการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ หากพบการระบาดเกษตรกรควรกระตุ้นให้ทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมๆกัน เพราะทำให้ระยะเวลาการเข้าทำลายของเพลี้ยไก่แจ้มีระยะสั้น ความเสียหายจากการทำลายของเพลี้ยไก่แจ้จะลดลง การกระตุ้นการแตกใบอ่อนสามารถทำได้โดยการใช้ยูเรีย (๔๖-๐-๐) ฟ่นในอัตรา ๒๐๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตรต่อต้น เมื่อสำรวจพบการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ให้ฉีดพ่นด้วยเชื้อราบีวเวเรียอัตรา ๒๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร และให้เกษตรกรหมั่นสำรวจการทำลายของด้วงเจาะลำต้น หากพบไข่ด้วงเจาะลำต้นที่รอยแผลบริเวณลำต้น ให้เก็บไข่ไปทำลาย ในระยะนี้มีปริมาณฝนมากขึ้น ให้ระวังโรคราใบดิด โรครากเน่าและโคนเน่า ซึ่งอาจพบการระบาดในหลาย ๆ พื้นที่ แนะนำเกษตรกรให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคดังกล่าว สวนทุเรียนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมควรทำการขุดระบายน้ำออกจากบริเวณเขตรากให้เร็วที่สุด

ส้มเขียวหวาน และส้มโชกุน - ระยะนี้เกษตรกรควรระวังการเข้าทำลายของหนอนแก้วส้ม หนอนขนใบส้ม และโรคแคงเกอร์ แนะนำเกษตรกรควรดูแลต้นส้มให้สมบูรณ์แข็งแรง และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ำอัตรา ๑ กิโลกรัมต่อน้ำ ๑๐๐ ลิตร ฉีดพ่นเพื่อป้องกันโรคแคงเกอร์ สำหรับหนอนผีเสื้อต่าง ๆ ให้ใช้สารสกัดสะเดา สลับกับเชื้อบีที และเชื้อราบีวเวเรียฉีดพ่น

ลองกอง - ระวังการระบาดของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และบางส่วนของพื้นที่จังหวัดตรัง ปัตตานี อาจพบการทำลายของแมลงค่อมทองในบางพื้นที่ของอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และอาจพบการทำลายของหนอนปลอกในบางพื้นที่ของจังหวัดสตูล นอกจากนี้ให้ระวังการทำลายผลผลิตจากแมลงวันผลไม้ ไม่ควรทิ้งผลที่เน่าเสียหรือผลที่ถูกทำลายไว้ในใต้โคนต้น หรือในสวน เพราะจะเป็นแพร่กระจายของแมลงวันผลไม้ได้ เกษตรกรสามารถนำผลที่เน่าเสีย หรือผลที่ถูกทำลายใส่ในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่น เพื่อให้แมลงวันผลไม้出不ไป

ศัตรูมะพร้าวที่เกษตรกรต้องสนใจ



หนอนหัวดำมะพร้าว เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งที่กำลังระบาดทำความเสียหายให้กับสวนมะพร้าวเป็นจำนวนมาก โดยทำลายทางใบล่าง เกษตรกรสามารถ



สังเกตเห็นอุโมงค์อยู่ใต้ใบ ซึ่งสร้างจากขี้หนอน เมื่อเอามือเขี่ยอุโมงค์ พบหนอนสีเขียว หัวสีดำ หรือดักแด้ผีเสื้ออยู่ภายใน หากพบเกษตรกรสามารถตัดทางใบที่มีหนอนหัวดำมะพร้าว อาศัยอยู่ ลงมาเผาทำลาย พร้อมทั้งขอสนับสนุนแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าวจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เพื่อปล่อยในสวนมะพร้าว สำหรับเกษตรกรที่ต้องการแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าวจะต้องแจ้งให้เกษตรตำบลทราบ เพื่อการดำเนินการต่อไป

กลุ่มพืชผัก

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีวเวอเรีย เชื้อราเมตาไรเซียมมิตรเกษตรกร ช่วยควบคุมศัตรูผัก

พืชตระกูลกะหล่ำ - ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ ต้องระวังการระบาดของโรคใบจุดอันทอนาเรีย และโรคราน้ำค้าง ซึ่งมีสาเหตุมาจากผักที่ปลูกได้รับความกระทบกระเทือนจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ทำให้ใบผักชำเชื้อราสามารถเข้าทำลายได้ง่าย ประกอบกับมีความชื้นสะสมอยู่ในแปลงมาก แนะนำเกษตรกรสำรวจแปลงผักอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดในระยะนี้ ให้ทำการป้องกันกำจัดด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ผักโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียม โบรอน เป็นประจำทุก ๗ วัน เกษตรกรควรหมั่นสำรวจและระวังการทำลายของด้วงหมัดผัก หนอนกระทุ้งผัก และหนอนใยผัก ซึ่งอาจพบได้ในบางพื้นที่

ถั่วฝักยาว - ระยะนี้ให้ระวัง **หนอนเจาะฝักถั่ว** **หนอนเจาะดอก** **แมลงหริ่งขาว** **เพลี้ยอ่อน** และเพลี้ยไฟ แนะนำให้เกษตรกรใช้สารสกัดสะเดา เชื้อบีที เชื้อราบีวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซียมร่วมกันในการควบคุมแมลงในแปลงถั่ว นอกจากนี้เกษตรกรควรเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นถั่วฝักยาวโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียม โบรอน เป็นประจำทุก ๗ วัน และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ำแล้วฉีดพ่น เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราให้ทั่วทรงพุ่ม และบริเวณโคนต้น

พืชตระกูลแตงระวังการระบาดของ ของโรคแอนแทรคโนส และโรคใบจุด

