



ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐



เดือนขาวนาระวังหนอนห่อใบข้าว และโรคไหม้ระบาด

หนู - ระวังอย่าให้มีหนูเข้าทำลายต้นข้าวและผลผลิต ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตจังหวัดพัทลุง

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล - เกษตรกรควรหมั่นตรวจการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล ในแปลงข้าวอยู่เสมอเพราะอาจเกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลขึ้นได้

โรคไหม้ข้าว - เกษตรกรในเขตพื้นที่หว่านข้าวใน **อัตราหนาแน่นสูง** เกษตรกรที่เก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์เอง และไม่ได้ทำการคลุกเมล็ดพันธุ์ ควรระวังการระบาดของโรคไหม้ เพราะจะเกิดการสะสมความชื้นในแปลงเป็นเวลานาน เกษตรกรควรหมั่นตรวจดูแปลงนาเป็นประจำ

แมลงสิง - แปลงนาที่ข้าวกำลังเข้าสู่ช่วงใกล้ออกดอก หรือระยะน้ำนม อาจเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของแมลงสิง เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงข้าวเป็นประจำ เมื่อพบเห็นแมลงสิงในอัตรา 4 ตัวต่อตารางเมตรให้ทำการควบคุม โดยใช้เชื้อราบีวเวอร์เรียฉีดพ่น

หนอนห่อใบข้าว - เกษตรกรต้องหมั่นตรวจดูแปลงข้าวในระยะกล้าในระยะนี้ อาจมีการระบาดของหนอนห่อใบข้าว โดยเฉพาะข้าวระยะกล้า และระยะใบธง

หอยเชอรี่ - จังหวัดสตูล ระวังการระบาดของหอยเชอรี่ในระยะนี้



ทุเรียน - ระวังให้หมั่นสำรวจการระบาดของหนอนเจาะผล และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน โดยอาจพบการระบาดได้ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล โรคผลเน่าอาจพบเกิดการระบาดได้ในเขตจังหวัดสตูล และตรัง สำหรับโรครากเน่าโคนเน่าที่เป็นโรคที่เกษตรกร

ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากระยะนี้มีฝนตกในปริมาณค่อนข้างมาก จากอิทธิพลของปรากฏการณ์ลานีญา เดือนเกษตรกรอย่าเข้าไปในบริเวณสวนในขณะที่พื้นดินอ่อนนุ่ม เพราะจะทำให้รากเสียหายและเกิดเชื้อราเข้าทำลายได้

มังคุด - ระวังอาการยางไหล แนะนำเกษตรกรทำการป้องกันโดยการใช้ปูนโดโลไมต์ ปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มธาตุแคลเซียมในช่วงเตรียมความพร้อมเพื่อการออกดอก หรือฉีดพ่นแคลเซียมเสริมในระยะติดผลอ่อน

ส้มโอ - ระยะนี้ให้ระวังหนอนเจาะผลระบาด โดยเฉพาะในเขตจังหวัดพัทลุง และสตูล แผลลงวันผลไม้อาจพบระบาดในเขตจังหวัดตรัง และสตูล แนะนำเกษตรกรทำการห่อผลป้องกัน

ส้มเขียวหวาน และส้มโชกุน - ระยะนี้เกษตรกรควรระวังการเข้าทำลายของ หนอนขนใบ และผีเสื้อมวนหวาน

ลองกอง - ระวังการระบาดของ หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง เพลี้ยแป้ง และแมลงวันผลไม้ นอกจากนี้เกษตรกรยังต้องหมั่นสำรวจการระบาดของโรคราสีชมพู ซึ่งมักจะระบาดในฤดูฝนโดยเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดตรัง และสตูล

มะพร้าว - ระวังการระบาดของ **หนอนหัวดำมะพร้าว** เกษตรกรหมั่นสำรวจต้นมะพร้าวภายในสวน หากเกษตรกรพบทางใบล่างมีขี้หนอน ลักษณะเป็นอุโมงค์อยู่ใต้ใบ เมื่อเอามือเขี่ยอุโมงค์ พบหนอนสีเขียว หัวสีดำ หรือดักด้ผีเสื้ออยู่ภายใน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตร เพื่อจะได้ควบคุมกำจัดต่อไป โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการในการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุม และระวังการระบาดของ **แมลงดำหนามมะพร้าว** แนะนำเกษตรกรสามารถตัดยอดที่ยังไม่คลี่มาเผาทำลาย เพื่อควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว ร่วมกับการขอสนับสนุนแตนเบียนแมลงดำหนามมะพร้าว เพื่อปล่อยในสวนมะพร้าว



มะละกอ - ระยะนี้เกษตรกรต้องหมั่นตรวจดูการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมะละกอ พันธุ์ ฮอลแลนด์ ควรหมั่นสำรวจและกำจัดแมลงกลุ่มเพลี้ย เช่น เพลี้ยอ่อน และแมลงหริ่งขาว เพราะอาจทำให้เกิดโรคใบจุดวงแหวนได้ นอกจากนี้ต้องระวังการระบาดของโรคจุดสีน้ำตาล โดยเฉพาะพันธุ์ฮอลแลนด์เกษตรกรควรมีการปรับปรุงดินโดยการใส่ปูนโดโลไมต์เพื่อเพิ่มธาตุแคลเซียมปีละ 1-2 ครั้ง

พืชตระกูลกะหล่ำ - ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของ **หนอนใยผัก** **หนอนกระทู้ผัก** **ด้วงหมัดผัก** และ **หนอนชอนใบ** เกษตรกรควรเก็บผักโดยการถอนทั้งรากออกจากแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของตัวอ่อนด้วงหมัดผัก นอกจากนี้ควรจะใช้เชื้อราเมตาไรเซียมผสมน้ำรดแปลงผัก เพื่อช่วยกำจัดตัวอ่อนด้วงหมัดผักในดิน แนะนำเกษตรกรสำรวจแปลงผักอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการใช้สารเคมี เมื่อพบการระบาดของหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก ด้วงหมัดผัก ซึ่งเป็นแมลงในกลุ่มปากกัดให้ทำการฉีดพ่นด้วยสารชนิดกินตาย เช่น สารสปีดสะเดา เชื้อบีที เป็นต้น ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะแมลงมักจะหลบหากินอยู่บริเวณใต้ใบ ยากต่อการฉีดพ่นให้ถูกตัวแมลง และอาจใช้เชื้อราบีวเวอเรีย หรือเชื้อราเมตาไรเซียม ร่วมด้วยเพื่อเป็นการลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดพ่นโดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีชนิดแรงลม misblower

ถั่วฝักยาว - ระยะนี้ให้ระวังการระบาดของ **เพลี้ยอ่อน** และ **เพลี้ยแป้ง** แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราบีวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซียมในการควบคุม สำหรับ **หนอนเจาะฝักถั่ว** ให้ใช้สารสปีดสะเดาสลับกับเชื้อบีทีในการป้องกันกำจัด นอกจากนี้ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมรำ และปุ๋ยหมักหว่านรอบโคน เพื่อป้องกันเชื้อราเข้าทำลายระบบราก

พืชตระกูลแตง - ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของโรคที่เกิดในสวนเหนือดิน เช่น **โรคโคนเน่าอย่างไหล** **โรคแอนแทรคโนส** และ **โรคใบจุด** เป็นต้น เกษตรกรควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ำแล้วฉีดให้ทั่วทรงพุ่ม เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา พร้อมทั้งฉีด **แคลเซียมโบรอน** เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และความต้านทานต่อโรค ส่วนโรคที่เกิด



ทางระบบราก ได้แก่ **โรคเหี่ยว** นั้น เกษตรกรควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยหมักหว่านในหลุมปลูก เพื่อเป็นการป้องกัน สำหรับโรคใบต่างๆที่เกิดจากการเข้าทำลายของไวรัส และต้นที่เป็นโรคเหี่ยวและตายแล้ว ให้ถอนแล้วเผาทำลาย นอกจากนี้ยังต้องหมั่นสำรวจการระบาดของ **หนอนผีเสื้อศัตรูแตงชนิดต่าง ๆ** **เพลี้ยอ่อน** **เพลี้ยไฟ** **ด้วงเต่าแตง** และ **แมลงวันแตง** เกษตรกรควรทำความสะอาดแปลงปลูก และห่อผลตั้งแต่ผลยังเล็ก สำหรับเพลี้ยอ่อน และด้วงเต่าแตง ให้ควบคุมด้วยสารสปีดสะเดา ส่วนเพลี้ยไฟ ควบคุมด้วยเชื้อราเมตาไรเซียม และเชื้อราบีวเวอเรีย สำหรับแตงกวาผลเล็กให้ฉีดพ่นไธออยล์ หรือปีโตเลียมอยล์เพื่อลดการวางไข่ของแมลงวันผลไม้

พริก - ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหมั่นสำรวจ การเข้าทำลายของ **แมลงหริ่งขาว เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ** หากพบการระบาดแนะนำให้ควบคุมโดยใช้เชื้อรา **บิวเวอเรีย** และเชื้อรา **เมตาไรเซียม** เกษตรกรบางพื้นที่อาจพบการทำลายของ **แมลงวันพริก** ได้ แนะนำเกษตรกรควรเก็บ **ผลพริก** ที่ถูกทำลายใส่ลงในถุงพลาสติก แล้วมัดปากถุง ให้นแน่น นำไปทิ้งนอกแปลงปลูก พร้อมทั้งฉีด



ไวท์ออยล์ หรือ **ปิโตเลียมออยล์** เพื่อลดปริมาณการวางไข่ของ **แมลงวันผลไม้** และ **คลุกเชื้อราเมตาไรเซียม ๑** กิโลกรัม ต่อปุ๋ยหมัก **๒๐** กิโลกรัม ใส่รอบโคนต้นเพื่อช่วยกำจัดด้งตัวของ **แมลงวันพริก** ที่อยู่ในดิน เกษตรกรควรใช้เชื้อรา **ไตรโคเดอร์มา** ป้องกัน **โรครากเน่าโคนเน่า และโรคเหี่ยวเหลือง** ไว้ตั้งแต่ต้นฤดูปลูกโดยการผสมกับรำและปุ๋ยหมักหว่านรอบทรงพุ่ม เพื่อควบคุมโรคที่เข้าทำลายระบบรากพริก และควรฉีดเชื้อรา **ไตรโคเดอร์มา** เมื่อพริกเริ่มให้ผลผลิต เพื่อป้องกัน **โรคแอนแทรคโนส** พร้อมทั้งฉีด **แคลเซียมโบรอน** เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความต้านทานต่อโรคให้แก่พริก และฉีด **ฟอสฟอรัสสังกะสี** เพื่อให้พริกปรุงอาหารได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังต้องหมั่น **รักษาความสะอาดในแปลงพริก** เพื่อลดแหล่งแพร่กระจายของโรค

.....