



ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐



เดือนชาวนาระวังหนอนห่อใบข้าว และโรคไหม้ระบาด

หนอนห่อใบข้าว - เกษตรกรในเขตจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล ระวังการระบาดของหนอนห่อใบข้าว โดยเฉพาะระยะกล้า และระยะใบธงซึ่งความเสียหายจะรุนแรง

โรคไหม้ข้าว - เดือนเกษตรกรระวังโรคไหม้ โดยเฉพาะแปลงที่ไ้เมล็ดพันธุ์เกิน 15 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากระยะนี้มีฝนตกอยู่เป็นระยะ ๆ แปลงข้าวที่แน่นเกินไปอาจเกิดโรคไหม้ระบาดได้ แนะนำพื้นที่ ๆ มีฝนตกให้ป้องกันการระบาดของโรคไหม้ด้วยการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาอัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตรให้ทั่วแปลง

แมลงสิง - ในบางพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงให้ระวังการเข้าทำลายของแมลงสิง เพราะจะทำให้เมล็ดข้าวลีบ และเป็นสาเหตุของโรคเมล็ดด่างอีกด้วย

หนอนกระทู้กล้าข้าว - เกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงอาจพบหนอนกระทู้กล้าข้าว



ทุเรียน - ระยะนี้ให้หมั่นสำรวจการทำลายหนอนเจาะผล และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนหากพบให้เก็บผลที่ถูกทำลายฝังดินลึก ๆ หรือผ่าผลเพื่อทำลายตัวหนอนที่อยู่ข้างใน

มังคุด - ให้ระวังเพลี้ยไฟ และอาการยางไหล แนะนำเกษตรกรหมั่นตรวจดูการทำลายของเพลี้ยไฟเมื่อมังคุดออกดอก และป้องกันอาการยางไหลโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียมโบรอนเสริมทางใบ

http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=428:2013-12-04-04-10-56&catid=57&Itemid=207

ส้มโอ - ระยะนี้ให้ระวังหนอนเจาะผล และแมลงวันผลไม้ระบาดระบาด โดยเฉพาะในเขต จังหวัดสงขลา และพัทลุง แนะนำเกษตรกรควรห่อผลป้องกัน

ส้มเขียวหวาน และส้มโชกุน - ระยะนี้เกษตรกรควรระวังการเข้าทำลายของ เพลี้ยชนิดต่าง ๆ เพลี้ยไก่แจ้ส้ม เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน แมลงวันผลไม้ หนอนขอนใบ และมีเสี้ยนมวนหวาน โดยเฉพาะเพลี้ยไก่แจ้ส้มซึ่งเป็นพาหะของโรคกรีนนิ่ง และหนอนขอนใบ ซึ่งจะทำให้ความเสียหาย ให้แก่ต้นส้มเป็นอย่างมาก แนะนำเกษตรกรป้องกันกำจัดแมลงปากดูดโดยใช้เชื้อรา บิวเวอร์เรีย และเชื้อราเมตาไรเซียม

ลองกอง - ระวังการระบาดของหนอนกินข้อดอก มีเสี้ยนมวนหวาน และแมลงวันผลไม้ หลังจากตัด แต่งข้อผลลองกองแล้วเกษตรกร ควรห่อผลป้องกันแมลงวันผลไม้ และมีเสี้ยนมวนหวาน

มะพร้าว - ระวังการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว เกษตรกรหมั่น สำรวจต้นมะพร้าวภายในสวน หากเกษตรกรพบทางใบล่างมีไข่หนอน ลักษณะเป็นอุโมงค์อยู่ใต้ใบ เมื่อเอามือเขี่ยอุโมงค์ พบหนอนสีเขียว หัว สีดำ หรือดักแด้มีเสี้ยนอยู่ภายใน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตร เพื่อจะได้ ควบคุมกำจัดต่อไป โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการในการ ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การควบคุม และระวังการระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าว แนะนำเกษตรกรสามารถตัดยอดที่ยังไม่ คลี่มาเผาทำลาย เพื่อควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว ร่วมกับการขอสนับสนุนแตนเบียนแมลงดำ หนามมะพร้าว เพื่อปล่อยในสวนมะพร้าว



มะละกอ - ระยะนี้เกษตรกรต้องหมั่นตรวจดูการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้



พืชตระกูลกะหล่ำ - ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของหนอนใยผัก หนอนกระทุ้งผัก ตัวห้ำดผัก และ เพลี้ยอ่อน เกษตรกรควรเก็บผักโดยการถอนทั้งรากออกจากแปลง เพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งอาหารของ ตัวอ่อนตัวห้ำดผัก นอกจากนี้ควรจะใช้เชื้อราเมตาไรเซียมผสมน้ำราดรดแปลงผัก เพื่อช่วย กำจัดตัวอ่อนตัวห้ำดผักในดิน แนะนำเกษตรกรสำรวจแปลงผักอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการใช้ สารเคมี เมื่อพบการระบาดของหนอนใยผัก หนอนกระทุ้งผัก ตัวห้ำดผักและเพลี้ยอ่อน ให้ทำการ ฉีดพ่นด้วยสารสกัดสะเดา เชื้อบีที และอาจใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย หรือเชื้อราเมตาไรเซียม ร่วมด้วย เพื่อเป็นการลดต้นทุน (การควบคุมหนอนใยผักนั้นต้องใช้เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดแรงลม

misblower เพื่อช่วยพาละอองสารเคมีเข้าไปถึงตัวหนอนได้ดียิ่งขึ้น) เพราะหนอนใบผักจะอยู่กระจายทั่วแปลงได้ใบ

ถั่วฝักยาว - ระยะนี้ให้ระวัง หนอนเจาะฝักถั่ว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟ แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราบีวเวอเรีย เชื้อราเมตาไรเซียมสำหรับควบคุมแมลงปากดูด ส่วนหนอนผีเสื้อให้ใช้สารสกัดสะเดา เชื้อบีที และอาจใช้เชื้อรากำจัดแมลงร่วมด้วย นอกจากนี้ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมรำละเอียด และปุ๋ยหมักหว่านรอบโคนต้น เพื่อป้องกันเชื้อราเข้าทำลายระบบราก

พืชตระกูลแตง - ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของ **โรคโคนเน่าขี้เถ้า**

โรคเหี่ยว และโรคใบด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัส

เกษตรกรควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยหมักหว่านในหลุมปลูก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ำแล้วฉีดให้ทั่วทรงพุ่ม เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา

พร้อมทั้งฉีด **แคลเซียมโบรอน** เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และ

ต้านทานต่อโรค ส่วนโรคใบด่าง และต้นที่เป็นโรคเหี่ยวและตายแล้ว ให้ถอนแล้วเผาทำลาย

นอกจากนี้ยังต้องหมั่นสำรวจการระบาดของ **เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ตัวเต่าแตง และแมลงวันแตง**

เกษตรกรควรทำความสะอาดแปลงปลูก และห่อผลตั้งแต่ผลยังเล็ก สำหรับเพลี้ยอ่อน และตัวเต่าให้ควบคุมด้วยสารสกัดสะเดา ส่วนเพลี้ยไฟ ควบคุมด้วยเชื้อราเมตาไรเซียม และเชื้อราบีวเวอเรีย สำหรับแตงกวาผลเล็กให้ฉีดพ่นไธโอออยล์ หรือปิโตเลียมออยล์เพื่อลดการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ (แมลงที่อยู่ใต้ใบควรใช้เครื่องพ่นสารเคมีชนิดแรงลม misblower)

พริก - ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหมั่นสำรวจ

การเข้าทำลายของ **แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน และเพลี้ย**

ไฟ หากพบการระบาดแนะนำให้ควบคุมโดยการใช้เชื้อรา

บีวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซียม เกษตรกรบางพื้นที่อาจ

พบการทำลายของ **แมลงวันพริก** ได้ แนะนำเกษตรกรควรเก็บ

ผลพริกที่ถูกทำลายใส่ลงในถุงพลาสติก แล้วมัดปากถุง

ให้แน่น นำไปทิ้งนอกแปลงปลูก พร้อมทั้งฉีด

ไธโอออยล์ หรือปิโตเลียมออยล์ เพื่อลดปริมาณการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ และคลุกเชื้อราเม

ตาไรเซียม ๑ กิโลกรัม ต่อปุ๋ยหมัก ๒๐ กิโลกรัม ใส่รอบโคนต้นเพื่อช่วยกำจัดดักแด้ของ

แมลงวันพริกที่อยู่ในดิน เกษตรกรควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกัน **โรครากเน่าโคนเน่า**

และโรคเหี่ยวเหลือง ไว้ตั้งแต่ต้นฤดูปลูกโดยการผสมกับรำและปุ๋ยหมักหว่านรอบทรงพุ่ม เพื่อ

ควบคุมโรคที่เข้าทำลายระบบรากพริก พร้อมทั้งฉีด **แคลเซียมโบรอน** เพื่อเสริมสร้างความ



แข็งแรง ความต้านทานต่อโรคให้แก่พริก และฉีดพ่นธาตุสังกะสี เพื่อให้พริกปรุงอาหารได้ดี
ขึ้น นอกจากนี้ยังต้องหมั่นรักษาความสะอาดในแปลงพริก เพื่อลดแหล่งแพร่กระจายของโรค

.....