



ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๙
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ทำ

เดือนขาวนาระวังหอยเชอรี่ โรคไหม้ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด

หนู - เกษตรกรในจังหวัดสตูล และพัทลุง ให้ระวังการระบาดของหนู เพราะอาจมีหนูเข้าทำลายต้นข้าวและผลผลิต

โรคไหม้ข้าว - เกษตรกรในเขตพื้นที่ที่มีฝนตก โดยเฉพาะในแปลงที่**หว่านข้าวในอัตราหนาแน่นสูง** ไม่ได้ทำการคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก หรือพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของโรคไหม้ข้าว เช่น อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา ให้ระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าว

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล - เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกรในเขตอำเภอกวนขนุน เมือง เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และเกษตรกรที่ใช้ข้าวพันธุ์พัทลุง (อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) ให้ระวังการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

หนอนห่อใบข้าว - เกษตรกรในจังหวัดสตูลต้องหมั่นตรวจดูแปลงข้าว ในระยะนี้อาจมีการระบาดของหนอนห่อใบข้าว โดยเฉพาะระยะข้าวแทงใบธงจะทำความเสียหายต่อผลผลิตเป็นอย่างมาก

หนอนกอข้าว - เกษตรกรในบางพื้นที่ของอำเภอเมือง จังหวัดตรัง และอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง อาจพบการเข้าทำลายของหนอนกอข้าว

หอยเชอรี่ - ในเขตอำเภอเมืองสตูล และอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ให้ระวังการระบาดของหอยเชอรี่ในระยะนี้

แมลงสี - ในบางพื้นที่ของอำเภอละงู จังหวัดสตูล อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา อาจพบการระบาดของแมลงสี แนะนำเกษตรกรให้ใช้เชื้อราบีวเวเรียในการป้องกันกำจัด อัตราส่วน ๒๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

กลุ่มไม้ผล

เงาะ - ระยะนี้มักพบเห็นการระบาดของเพลี้ยแป้ง ในเขตอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง หากพบการระบาดให้ทำการกำจัดด้วยเชื้อราบีวเวอเรีย นราธิวาสอาจมีการระบาดของแมลงวันผลไม้ในสวนเงาะ

ทุเรียน - ระยะนี้สวนทุเรียนบางแห่งอาจจะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ทุเรียนก็จะเข้าสู่ช่วงแตกใบอ่อน ให้ระวังการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้เกษตรกรควรกระตุ้นให้ทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมๆกัน เพื่อทำให้ระยะเวลาการเข้าทำลายของเพลี้ยไก่แจ้มีระยะสั้น ความเสียหายจากการทำลายของเพลี้ยไก่แจ้จะลดลง การกระตุ้นการแตกใบอ่อนสามารถทำได้โดยการใช้ยูเรีย (๔๖-๐-๐) ฟ่นในอัตรา ๒๐๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตรต่อต้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ หากพบการระบาดให้ฉีดพ่นด้วยเชื้อราบีวเวอเรียอัตรา ๒๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร และให้เกษตรกรหมั่นสำรวจการทำลายของด้วงเจาะลำต้น หากพบไข่ด้วงเจาะลำต้นที่รอยแผลบริเวณลำต้น ให้เก็บไข่ไปทำลาย ในระยะนี้มีปริมาณฝนมากขึ้น ให้ระวังโรคราใบติด โรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งอาจพบการระบาดในหลาย ๆ พื้นที่ แนะนำเกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคดังกล่าว สวนทุเรียนในพื้นที่ไม่เหมาะสมควรทำการขุดระบายน้ำออกจากบริเวณเขตรากให้เร็วที่สุด

ส้มเขียวหวาน และส้มโชกุน - ระยะนี้เกษตรกรควรระวังการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ ผีเสื้อมวนหวาน และโรคแคงเกอร์ แนะนำเกษตรกรควรดูแลต้นส้มให้สมบูรณ์แข็งแรง และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ำอัตรา ๑ กิโลกรัมต่อน้ำ ๑๐๐ ลิตร ฉีดพ่นเพื่อป้องกันโรคแคงเกอร์ พร้อมทั้งฉีดพ่นธาตุแคลเซียมโบรอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นส้มสำหรับผีเสื้อมวนหวาน ให้ใช้กรงดักพร้อมสวิงจับ ส่วนแมลงวันผลไม้ให้เน้นการทำความสะอาด เก็บผลที่ถูกทำลายเน่าเสียไปทำลาย พร้อมกับฉีดพ่นผลิตภัณฑ์บีโตเลียมออยล์ หรือสมุนไพรไล่แมลงวัน เช่น ใบสะเดาแก่ ใบมะกรูดแก่ หญ้าวงช้าง ข่า เป็นต้น เพื่อลดการวางไข่

ส้มโอ - ระวังหนอนเจาะผล แมลงวันผลไม้ เกษตรกรควรห่อผลป้องกัน และควรฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนการห่อผลเพื่อป้องกันเชื้อรา

ลองกอง - ระวังการระบาดของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง แนะนำเกษตรกรหลังจากเก็บผลผลิตหมดแล้วควรรีบตัดแต่งทรงพุ่ม และใส่ปุ๋ยให้ลองกองมีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ บางพื้นที่

อาจยังเก็บผลผลิตไม่หมดให้ระวังการทำลายผลผลิตจากแมลงวันผลไม้ เกษตรกรควรห่อผลเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงวันผลไม้ ไม่ควรทิ้งผลที่เน่าเสีย หรือผลที่ถูกทำลายไว้ในใต้โคนต้น หรือในสวน เพราะจะเป็นแหล่งแพร่กระจายของแมลงวันผลไม้ได้ เกษตรกรสามารถนำผลที่เน่าเสีย หรือผลที่ถูกทำลายใส่ในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่น เพื่อไม่ให้แมลงวันผลไม้ออกไปได้

หนอนหัวดำศัตรูมะพร้าวที่ต้องร่วมใจกำจัด



หนอนหัวดำมะพร้าว เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่ง

ที่กำลังระบาดทำความเสียหายให้กับสวนมะพร้าวเป็นจำนวนมาก โดยทำลายทางใบล่าง เกษตรกรสามารถสังเกตเห็นอุโมงค์อยู่ใต้ใบ ซึ่งสร้างจากขี้หนอน เมื่อเอามือเขี่ยอุโมงค์



พบหนอนสีเขียว หัวสีดำ หรือดักแด้ผีเสื้ออยู่ภายใน หากพบเกษตรกรสามารถตัดทางใบที่มีหนอนหัวดำมะพร้าวอาศัยอยู่ ลงมาเผาทำลาย พร้อมทั้งขอสนับสนุนแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าวจากศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เพื่อปล่อยในสวนมะพร้าว สำหรับเกษตรกรที่ต้องการแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าวจะต้องแจ้งให้**เกษตรตำบลทรวน** เพื่อดำเนินการต่อไป

กลุ่มพืชผัก

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีวเวอเรีย เชื้อราเมตาไรเซียมมิตรเกษตรกร ช่วยควบคุมศัตรูผักปลอดภัยต่อสุขภาพ

พืชตระกูลกะหล่ำ - ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ ต้องระวังการระบาดของโรคใบจุดอันธอนาเรีย และโรคราน้ำค้างซึ่งมีสาเหตุมาจากผักที่ปลูกได้รับความกระทบกระเทือนจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ทำให้ใบผักชำเชื้อราสามารถเข้าทำลายได้ง่าย ประกอบกับมีความชื้นสะสมอยู่ในแปลงมาก แนะนำเกษตรกรสำรวจแปลงผักอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดในขณะนี้ ให้ทำการป้องกันกำจัดด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ผักโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียม โบรอน เป็นประจำทุก ๗ วัน เกษตรกรควรหมั่นสำรวจและระวังการทำลายของด้วงหมัดผัก หนอนกระทุ้งผัก และหนอนใบผัก ซึ่งอาจพบได้ในระยะนี้

พืชตระกูลแตงระวังการระบาดของโรคแอนแทรคโนส และโรคใบจุด

ถั่วฝักยาว - ระยะนี้ให้ระวัง **หนอนเจาะฝักถั่ว** และ **เพลี้ยอ่อน** แนะนำให้เกษตรกรใช้สารสกัดสะเดา เชื้อบีที และเชื้อราบิวเวอเรีย ร่วมกันในการควบคุมแมลงแปลงในแปลงถั่ว นอกจากนี้เกษตรกรควรเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นถั่วฝักยาวโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียม โบรอนเป็นประจำทุก ๗ วัน และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ำแล้วฉีดพ่น เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราให้ทั่วทรงพุ่ม

พืชตระกูลแตง - ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของโรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส และโรครากเน่าโคนเน่า เพราะมีความชื้นค่อนข้างมาก ประกอบกับมีฝนตกมากขึ้น แนะนำเกษตรกรหมั่นทำความสะอาดแปลงปลูก และผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณทรงพุ่ม พร้อมทั้งฉีด **แคลเซียมโบรอน** เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและ **ต้านทานโรคบริเวณทรงพุ่ม (ส่วนเหนือดิน)** นอกจากนี้ยังต้องหมั่นสำรวจการระบาดของ **ด้วงเต่าแตง** **เพลี้ยอ่อน** **หนอนผีเสื้อศัตรูแตงชนิดต่างๆ** เช่น **หนอนคืบ** **หนอนเจาะดอก** **หนอนเจาะผล** **หนอนใยฝัก** และ **หนอนกินผิวเปลือกแตงโม** แนะนำเกษตรกรควรควบคุมหนอนผีเสื้อ โดยการใช้สารสกัดสะเดาสลับกับเชื้อบีที ร่วมกับการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย **เพลี้ยอ่อน** ควบคุมด้วยสารสกัดสะเดาร่วมกับเชื้อราบิวเวอเรีย นอกจากนี้ให้ระวังการเข้าทำลายของแมลงวันแตงโดยใช้ผลิตภัณฑ์บีโตเลียมออยล์ อัตรา ๑/๕ ของคำแนะนำในฉลาก



พริก - ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหมั่นสำรวจการระบาดของโรคแอนแทรคโนส และโรครากเน่าโคนเน่า เกษตรกรควรฉีด **แคลเซียมโบรอน** เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงต้านทานต่อโรคให้แก่พริก และฉีดพ่นธาตุสังกะสี เพื่อให้พริกสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น หมั่นรักษาความสะอาดแปลงปลูก ถ้าหากสำรวจพบการระบาดของโรคแอนแทรคโนส และโรครากเน่าโคนเน่าในแปลงพริกให้ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วทรงพุ่ม พร้อมทั้งใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมรำละเอียด และปุ๋ยหมัก อัตราส่วน ๑:๕:๑๐๐ หว่านรอบทรงพุ่ม เก็บผล และต้นที่เป็นโรคออกเผาทำลายนอกแปลงปลูก



หอมแดง - ระยะนี้ให้ระวังการระบาดของหนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก
เกษตรกรควรควบคุมโดยการใส่สารสกัดสะเดา สลับกับเชื้อบีที หรือเชื้อไวรัส เอ็น พี วี โดย
สำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เพราะระยะนี้สภาพอากาศเอื้อต่อการระบาดของหนอน
เพิ่มขึ้น