

หนอนเจาะผลละมุด

ระยะนี้ในบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลา และพัทลุงให้ระวังการเข้าทำลายของหนอนเจาะผลละมุด เพราะทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายได้



หนอนเจาะผลละมุด

แนวทางการจัดการ

Fruit borer (*Heterographis bengalella*)



ตัวเต็มวัยของเจาะผลละมุดเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลางมีปีกบนสีเทาปีกล่างสีเทาใส เมื่อกางปีกออกจะกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร หลังจากตัวเต็มวัยผสมพันธุ์กันแล้ว ตัวเมียจะวางไข่บนผลละมุดตั้งแต่ผลยังไม่สุก เมื่อหนอนฟักออกมาจากไข่ หนอนจะเจาะเข้ามากัดกินในผล และเข้าดักแด้ภายในผล

หนอนชนิดนี้จะเข้าไปกัดกินภายในผลละมุด ทำให้ผลละมุดเสียหาย ไม่สามารถนำไปขายได้ เพราะผลมีตำหนิ มีตัวหนอน และขี้หนอนอยู่ภายในผล แนะนำเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงตั้งแต่ผลละมุดยังมีขนาดเล็กจนกระทั่งผลสุก และต้นละมุดที่มีผลผลิตมาก โดยสังเกตรอยเจาะหรือมีขี้หนอน หากพบให้ควบคุมก่อนที่จะทำความเสียหายรุนแรง

- 1) ตัดแต่งกิ่งละมุดให้ต้นโปร่งเพื่อไม่ให้ผลเบียดกัน จนเป็นสาเหตุให้หนอนเข้าทำลาย
- 2) เก็บผลละมุดที่ถูกเข้าทำลายไปกำจัดโดยการเผาไฟหรือใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น นำไปทิ้งนอกแปลง
- 3) กัดดักแสงไฟ (black light) เพื่อล่อตัวเต็มวัย ซึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืนมาทำลาย แต่ควรติดตั้งนอกแปลงปลูก
- 4) สุ่มควันไฟไล่ตัวเต็มวัย
- 5) ฉีดพ่นด้วยสารสกัดสะเดา อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
- 6) ฉีดพ่นเชื้อ BT สายพันธุ์เคอสตาโก้ หรือ ไอซาไว
- 7) หากระบาดมาก เกษตรกรสามารถใช้สารเคมีกำจัดแมลงตั้งแต่ผลขนาดเล็ก เช่น มาลาไรออน คาร์บาริล หรือ เมโทรมิล โดยหยุดฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน